

ALAMYCIN LA ad us. vet., solution injectable

Oxytétracycline à longue durée d'action pour bovins, ovins et porcins

Composition

Oxytétracyclinum 200 mg, ut oxytétracyclinum dihydricum, magnesii oxidum leve, N,N-dimethylacetamidum, dinatrii edetas, Antiox.: Natrii hydroxymethansulfinas 4 mg, aqua ad iniectabilia q.s. ad solutionem pro 1 ml

Propriétés / Effets

L'oxytétracycline possède un large spectre d'action contre les germes pathogènes gram-positifs et gram-négatifs, quelques rickettsies et gros virus. ALAMYCIN LA possède grâce à sa formulation spéciale une action antibactérienne de longue durée.

Pharmacocinétique

Les taux sanguins maximaux sont déjà atteints 4 à 8 heures après injection intramusculaire chez les bovins. Des taux sanguins thérapeutiques sont maintenus pendant au moins 2 jours chez les porcins et sont décelés jusqu'à 5 jours après injection chez les ovins et les bovins.

Indications

Traitement des infections causées par ou associées à des germes sensibles à l'oxytétracycline.

- **Bovins:** actinobacillose, diphtérie des veaux, panaris, traitement de soutien des mammites, métrites, pasteurelloses et pneumonies.
- **Ovins:** piétin, mammites, métrites, ombilites, arthrites, pneumonies.
- **Porcins:** rouget, syndrome MMA, ombilites, arthrites.

Posologie / Mode d'emploi

20 mg / kg poids vif (1 ml / 10 kg poids vif) en injection intramusculaire profonde. Volume maximum par point d'injection; bovin 20 ml; ovin 5 ml; porcine 10 ml; porcelet à 1 jour: 0.2 ml; à 7 jours: 0.3 ml; à 14 jours: 0.4 ml; à 21 jours: 0.5 ml

Limitations d'emploi

Contre-indications: Ne pas utiliser chez des animaux souffrant d'affections rénales ou hépatiques. **Précautions:** Ne pas utiliser chez le **cheval**, le **chien** et le **chat**. L'emploi de la tétracycline pendant la gestation ou le développement des dents peut provoquer une dyschromie dentaire chez les jeunes animaux.

Effets indésirables

Des réactions passagères en particulier aux points d'injections peuvent se présenter.

Délais d'attente

- **Lait:** 5 jours
- **Tissus consommables:** 21 jours

Interactions

D'autres injections nécessaires simultanément ne devraient pas être appliquées au même site d'injection.

Remarques particulières

La solution peut changer de couleur après le premier emploi, sans préjudicier son activité. Ne pas diluer la solution injectable! Conserver hors de portée des enfants, à l'obscurité, à température ambiante, mais à moins de 25°C. **Ne pas utiliser au-delà de 28 jours après administration de la première dose.**

Présentation

Flacon de 100 ml

Fabricant

Norbrook, Newry, GB

Swissmedic: 48'342 (A)

ATCvet: QJ01AA06