

Composition

Oxytetracyclinum 29,7 mg ut oxytetracyclinum hydrochloridum, propylenglycolum 55mg, color.: E 131 3,0 mg, excip. ad susp. pro 1 ml, propellentia ad aerosolum pro vase 140 ml

Propriétés / Effets

L'oxytétracycline possède un large spectre d'action contre les germes pathogènes gram-positifs et gram-négatifs.

Pharmacocinétique

Lors de l'emploi topique correcte l'Alamycin Spray n'agit que localement sans apparition d'action systémique.

Indications

Thérapie du piétin et d'infections locales causées par ou associées à des germes sensibles à l'oxytétracycline chez les bovins, ovins et porcins.

Posologie / Mode d'emploi

Avant l'emploi, laver les plaies ou laver et parer les onglons. Agiter la bombe. Vaporiser pendant quelques secondes sur les plaies ou sur les onglons. Après le traitement des onglons, tenir les animaux pendant une heure sur un sol sec.

Limitations d'emploi

Contre-indications: aucune

Précautions: protéger les yeux

Effets indésirables

hypersensibilité connue aux tétracyclines

Délais d'attente

0 jours

Interaction

aucune

Remarques particulières

A employer que topiquement. Ne pas fumer lors de l'emploi d'ALAMYCIN Spray. Ne pas inhaler l'aérosol. Ne pas vaporiser en direction d'un feu ou d'objets incandescents. Laver les mains après emploi. Bombe sous pression, ne pas ouvrir et ne pas brûler. Conserver hors de portée des enfants, à moins de 25°C. Protéger du soleil.

Présentation

Aérosol de 140 ml

Fabricant

Norbrook, Newry, GB

Swissmedic: 56'331 (A)

ATCvet: QD06AA03