

NOROCILLIN LA ad us. vet., solution injectable

Pénicilline à longue durée d'action pour bovins, ovins, porcins, canins et félins

Composition

Benzylpenicillinum benzathinum 150'000 U.I.,
Benzylpenicillinum procainum 150'000 U.I.,
Polysorbatum 80, Povidonum, Dinatrii edetas, Kalii
dihydrogenophosphas, Natrii citras, Carmellosum
natricum, Simethiconum. Conserv.: E218 1,5 mg,
Aqua ad iniectabilia q.s. ad solutionem pro 1 ml.

Propriétés / Effets

Le nombre réduit d'injections prédestine la NOROCILLIN LA aux pénicillino-thérapies de longue durée.

Pharmacocinétique

Les taux sanguins thérapeutiques de la procaïne-pénicilline sont maintenus après injection intramusculaire pendant env. 24 heures, ceux de la benzathine-pénicilline, qui n'est absorbée que lentement, pendant **3 à 4 jours**.

Indications

Traitement des infections systémiques dues ou associées à des micro-organismes sensibles aux pénicillines chez les bovins, ovins, porcins, canins et félins.

Posologie / Mode d'emploi

en injection intramusculaire profonde
uniquement

- **Bovins, ovins, porcins:** 12'000 U.I. de pénicilline / kg poids vif (2 ml / 50 kg p.v.)
- **Canins, félins:** 30'000 U.I. de pénicilline / kg poids vif (1ml / 10 kg p.v.)

Limitations d'emploi

Contre-indications: Hypersensibilité connue aux pénicillines.

Précautions: Ne pas injecter NOROCILLIN LA par voie intraveineuse.

Effets indésirables

Poussées transitoires de fièvre, vomissements, frissons, apathie et incoordination; chez les cochons et les truies en gestation, écoulement vaginal associé à l'avortement.

Délais d'attente

- **Lait:** 8 jours
- **tissus consommables:** 14 jours

Interactions

aucune

Remarques particulières

Conserver hors de portée des enfants, à l'obscurité, à température ambiante (15 - 25°C).

Ne pas utiliser au-delà de 28 jours après administration de la première dose.

Présentation

Flacon de 100 ml

Fabricant

Norbrook, Newry, GB

Swissmedic: 48'708 (A)

ATCvet: 48'708