

Composition

Acepromazinum 10 mg ut Acepromazini hydrogenomaleas, Aqua ad injectabilia ad 1 ml

Propriétés / Effets

L'acépromazine est une phénothiazine à action sédatrice, hypnotique, antiémétique, et qui potentialise l'effet des narcotiques.

Pharmacocinétique

Après application intraveineuse de 1.3 - 1.5 mg / kg poids vif. l'action pharmacologique dure env. 4 heures. Après application intraveineuse la demi-vie d'élimination est d'env. 7 heures.

Indications

Pour tranquilliser des animaux excités, agressifs ou regimbeurs; sédation pour examens vétérinaires, petites interventions, traitements dentaires; prémédication avant anesthésie.

Posologie / Mode d'emploi

0.03 mg - 2 mg / 10 kg poids vif selon la durée de la sédation désirée en injection sous-cutanée, intramusculaire ou **lentement** par voie intraveineuse.

chien

- **i.v.:** 0.05 ml / 10kg poids vif
- **s.c., i.m.:** 0.1 ml / 10 kg poids vif

chat

- **i.v.:** 0.05 – 0.1 ml / 10kg poids vif
- **s.c., i.m.:** 0.1 – 0.15 ml / 10 kg poids vif

Limitations d'emploi

Ne pas employer pour le traitement du trémor dû à un empoisonnement aux organo-phosphorés, les phénothiazines potentialisant leur toxicité. Utiliser avec précaution lors d'affections hépatiques ou de prédispositions à des crampes (épilepsie).

Effets indésirables

Utiliser avec précaution chez des patients sous stress, en états de chocs, lors d'hypovolémie ou d'affections cardiaques. L'acépromazine provoque une baisse de pression artérielle. Face à une hypotension ou un surdosage, administrer de la noradrénaline. Eviter l'emploi d'analeptique respiratoires contenant de l'adrénaline. L'injection intracarotidienne accidentelle peut provoquer une désorientation, des crampes, voire la mort. En pré-anesthésie il est conseillé d'associer de l'atropine à l'azépromazine, pour prévenir son action négative sur le vague.

Remarques particulières

Ne pas utiliser le produit au-delà de la date imprimée sur l'emballage avec la mention „EXP“. Ne pas utiliser au-delà de 1 mois après administration de la première dose. Conserver à l'obscurité, entre 15°C - 25°C, hors de portée des enfants.

Présentation

Flacon de 10 ml

Fabricant

Fatro S.p.A., Ozzano Emilia, I

Swissmedic: 56'719 (B)

ATCvet: QN05AA04